Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela 57 (2) 10-14 (2018). 3 Figs.

DOS NUEVOS REGISTROS DE AVES ACUÁTICAS MIGRATORIAS DEL NEÁRTICO PARA EL ESTADO SUCRE: *Anas americana* GMELIN, 1789 (ANATIDAE) Y *Larus argentatus* PONTOPPIDAN, 1763 (LARIDAE)

Jesús Bello Pulido[1], Jorge Muñoz, *Gedio Marín Espinoza[2] & Luis G. González Bruzual[3]

[1]*Centro de Investigaciones Ecológicas Guayacán*, *Universidad de Oriente*, *Venezuela*.

[2]*Laboratorio de Ecología de Aves*, *Departamento de Biología*, *Núcleo de Sucre*, *Universidad de Oriente*, *Venezuela*.

[3]*Instituto Universitario de Tecnología Industrial Rodolfo Loero Arismendi*, *Isla de Margarita*, *Venezuela*.

**Autor corresponsal*

RESUMEN: Se señala por primera vez al Pato Calvo (*Anas americana*) y a la Gaviota Argéntea (*Larus argentatus*), dos aves acuáticas migratorias boreales, identificadas a partir de material fotográfico tomado en la costa norte de la península de Araya, estado Sucre. El Pato Calvo fue avistado al extremo Oeste de la península, en una laguna temporal Cerro Macho ubicada al extremo Oeste de la Península de Araya y dos individuos en el complejo lagunar Playa-Grande Copey, adyacente a la ciudad de Carúpano. El individuo de la Gaviota Argéntea, en plumaje transitorio tercer invierno-adulto, fue fotografiado en la playa del pueblo de Guayacán, al NE de la península. Estos dos hallazgos de aves migratorias neárticas aumentan el número de especies registradas para el estado Sucre en las últimas dos décadas, lo que hace necesario mantener monitoreo constante en la región, ya que es un sitio de tránsito frecuente de aves migratorias del Neártico.

ABSTRACT: For the first time photographic documentation is obtained of two boreal migrating aquatic birds, one individual of Herring Gull (*Larus argentatus*) and a flock of American Wigeon (*Anas americana*), both species seen in north coast of peninsula of Araya, state of Sucre. American Wigeon was observed at West end Araya Peninsula (in a lagoonlet Cerro Macho), and two individuals in marine-coastal lagoon complex Playa Grande-Copey adjacent to the city of Carúpano. Herring Gull was photographed in 3rd winter-adult transition migrating birplumage, at beach in NE of peninsula (Guayacán). These two records of neartic migrating bird increase the species numbers in state of Sucre in the last two decades, what makes it necessary to maintain a permanent monitoring in the region, since it is a usual transient site of migrating birds from Nearctic.

Las características ecológicas y ubicación geográfica del estado Sucre −dentro de las rutas de migración otoñal y primaveral de aves provenientes del Neártico (Morrison & Myers 1987)− han permitido varios nuevos registros aves acuáticas migratorias para la región sucrense en las últimas décadas (*e.g*., Marín *et al*. 2008; Marín *et al*. 2015; Muñoz *et al*. 2015).

Particularmente, los humedales de la Península de Araya resultan sitios de pernocta habitual de aves migrantes de latitudes boreales (McNeil *et al*. 1985; Marín *et al*. 2006; Aguilera *et al*. 2016; Marín *et al*. 2017); de hecho, en los humedales peninsulares se han señalado nuevas especies de aves para Venezuela (McNeil *et al*. 1985a,b; Mercier *et al*. 1987; Marín *et al*. 2002).

En esta nota se señalan dos nuevos registros de aves acuáticas migratorias de la Región Neártica para el estado Sucre: *Anas americana* Gmelin, 1789 (Anatidae) y *Larus argentatus* Pontoppidan, 1763 (Laridae), identificadas mediante material fotográfico tomado en humedales de la costa Norte de la Península de Araya, estado Sucre (Fig. 1).

Anas americana (Pato Calvo)

El Pato Calvo es un migrante boreal, registrado en Sudamérica al norte de Colombia y Venezuela, y en las islas de Trinidad y Tobago; usualmente se le ve en grupos pequeños y ocasionalmente en bandadas numerosas (Hilty & Brown 2001; Restall *et al*. 2006).

En el estado Sucre, esta especie había sido avistada en dos oportunidades: el 14 de diciembre de 2009 en la península de Araya (una bandada) y en dos oportunidades más en diciembre de 2010 y 2011, y el 21 de diciembre del 2009 (dos individuos) en el complejo lagunar



Fig. 1. Sitios de los registros del Pato Calvo (*Anas americana*), al Oeste (recuadro blanco □), y la Gaviota Argéntea (*Larus argentatus*), al NE (recuadro negro ■), de la península de Araya.

marino-costero Playa Grande-Copey (10º39'56,60" N; 63º18'12,17" O), cercano a la ciudad de Carúpano, del Municipio Bermúdez.

En las dos fotografías tomadas en el complejo marino-costero Playa Grande-Copey, el individuo estaba muy distanciado para validar su presencia; con el nuevo el material fotográfico analizado, obtenido en la laguna Cerro Macho, cercana a la laguna Madre, al extremo Oeste de la Península de Araya, un humedal con vegetación hidrófila emergente (*Typha dominguensis*) (10°35'0,93" N; 64°13'13,49" O), se ratifica el registro. Se trataba de una bandada mixta de machos y hembras, con algunos machos con su llamativo plumaje, y el resto de las aves tenían plumaje eclíptico (en el cual machos y hembras poseen coloraciones similares), característico de la temporada no reproductiva (Fig. 2).

Este anátido migrante se identificó por el pico blanco con el tercio distal negro; ancha capucha blanca característica que comienza en las plumas sobre la base superior del pico, extendiéndose por la frente y la parte superior de la cabeza; antifaz circunocular negro, que se torna en una banda verde iridiscente que desciende hacia la parte lateral de la nuca; flancos blancos sugestivos y cola negra (American Ornithologists' Union 1983).

Larus argentatus (Gaviota Argéntea)

La Gaviota Argéntea es un visitante puntual en las islas del Caribe y raro en la costa continental del norte de Sudamérica donde se le ha registrado en Venezuela, Colombia, Ecuador y las Guayanas (Restall *et al*. 2006); aunque estos autores la nominan como *Larus smithsonianus*.




Fig. 2. A. Bandada mixta de Pato Calvo (*Anas americana*), con machos en plumaje adulto característico (círculos negros), y el resto en plumaje eclíptico invernal (círculo rojo). B. Detalle de un individuo macho con plumaje típico.




Fig. 3. A. Individuo en plumaje tercer invierno-adulto de la Gaviota Argéntea (*Larus argentatus*), rodeado por un grupo de guanaguanares (*Leucophaeus atricilla*), foto superior; B. En detalle, foto inferior.

En Venezuela existen avistamientos esporádicos en occidente específicamente en los estados Zulia (Los Olivitos) y Falcón; en el oriente, solo avistada en el estado Anzoátegui, en las lagunas de Unare, en febrero (Hilty 2003), y Píritu, en diciembre.

Como parte de estos hallazgos para el estado Sucre, se señala un individuo de este lárido, en plumaje transitorio tercer invierno-adulto (Fig. 3), fue fotografiado en la playa (a ~250 m de la orilla) del pueblo de Guayacán (10°39'3,32" N; 63°49'49,59" O), al NE de la península de Araya, el 13 de enero de 2010, cuando se encontraba junto a una bandada de guanaguanares (*Leucophaeus atricilla* L. 1758).

Los rasgos diagnósticos para la identificación de la Gaviota Argéntea se basaron en el pico amarillo con la mancha roja, y vestigios de la mancha negruzca (característica del plumaje del tercer invierno) en la punta la mandíbula; plumaje de la cabeza, cuello y vientre blancos; manto de coloración gris claro; extremo de las alas negro y blanco que le dan apariencia escamada y multiespecular (American Ornithologists' Union 1983).

REFERENCIAS

Aguilera, E., G. Marín & J. Muñoz. 2016. Riqueza, abundancia y diversidad de aves acuáticas asociadas al complejo lagunar Chacopata-Bocaripo, estado Sucre, Venezuela. *Rev. Venez. Ornitol*. 6: 4-12.

American Ornithologists' Union (AOU). 1983. *Check-list of North American birds*. 6th ed. Am. Ornithol. Union. Washington, D.C. 464 pp.

Hilty, S.L. 2003. *Birds of Venezuela*. Princeton University Press. Princeton and Oxford.

Hilty, S. & W.L. Brown. 2001. *Guía de las aves de Colombia*. Editorial SAO. Colombia. 1030 pp.

Marín, G., J. Muñoz, J.R. Rodríguez, D. Muller, M. Herrera, O. Oliveros, P. Cornejo & W. Silva 2003. Nuevas registros y extensiones regionales de distribución de especies de aves en la región nororiental de Venezuela. *Acta Biol. Venez*. 23: 27-35.

Marín G., J. Muñoz, S. Guevara & J.R. Rodríguez. 2002. *Calonectris diomedea* nuevo procelárido para Venezuela. *Ornitol. Neotrop*. 13: 91-92.

Marín G. L. Blanco, J. Muñoz, A. Prieto & R. Alzola 2006. Dependencia de pequeñas lagunetas y charcas costeras para la avifauna residente y migratoria: dos casos en Venezuela. *Bol. Oceanogr. Venez*. 45: 149-163.

Marín, G., J. Muñoz, D. Muller & R. Navarro. 2008. Nuevos registros y extensiones de distribución para especies de aves en el estado Sucre. *Bol. Centro Invest*. 42: 551-557.

Marín, G., J. Muñoz & L.G. González. 2015. Un nuevo registro y cuatro nuevas extensiones de distribución de especies de aves para el Estado Sucre. *Saber* 28: 357-352.

Marín G., J. Muñoz & L.G. González. 2017. *La avifauna acuática marino-costera de la península de Araya, Venezuela: Guía fotográfica comentada*. Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Oriente. Cumaná, Venezuela. 163 pp.

McNeil, R., J.R. Rodríguez & F. Mercier. 1985a. Winter range expansion of the Long-billed Curlew (*Numenius americanus*) to the South American continent. *Auk* 102: 174-175.

McNeil, R., J.R. Rodríguez & F. Mercier. 1985b. Eastward range expansion of the Marbled Godwit in South America. *Wilson Bull*. 97: 243-244.

McNeil, R., H. Ouellet & J.R. Rodríguez. 1985. Urgencia de un programa de conservación de los ambientes costeros (lagunas, planicies fangosas, laderas costeras y manglares) del Norte de América del Sur. *Bol. Soc. Venez. Cienc. Nat*. 50: 449-474.

Mercier, F., R. McNeil & J.R. Rodríguez. 1987. First occurrence of Bar-tailed Godwit in South America and status of the Marbled Godwit in Northeastern Venezuela. *J. Field Ornithol*. 58: 78-80.

Morrison, R.I.G & J.P. Myers. 1987. Wader migration systems in the New World. Wader *Studies Group Bull*. 49S: 57-69.

Muñoz, J., G. Marín & L.G. González. 2015. Primer registro de la Gaviota Patinegra (*Thalasseus sandvicensis*) en el Estado Sucre, Venezuela. *Bol. Inst. Oceanogr. Venez*. 54: 235-237.

Restall, R., C. Rodner & M. Lentino. 2006. *Birds of northern South America*. Vol. 1. Yale University Press. New Haven & London. 880 pp.

Recibido: Abril 2018.
Aceptado: Julio 2018.